




Kirkwood Red Navel






Árbol con fruta



Forma de la hoja



Tamaño y forma del fruto

Kirkwood Red Navel: Información técnica

Navel de gran calidad, pigmentación intensa en el interior y tonalidad rojiza en el exterior.

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Tipo de variedad | Naranja Navel. Mutación natural en un árbol de Navel Palmer | Características del árbol | Más compacto que el árbol de la Navel Cara Cara. La corteza y ramas del árbol también desarrollan una ligera pigmentación rojiza, esta pigmentación también se observa en los haces vasculares de las hojas. |
| Origen | Kirkwood, Eastern Cape, Sudáfrica. | Tamaño del fruto | Grande a mediano. |
| Obtentor | Mr. A. Potgieter. | Forma del fruto | Redondo a ligeramente ovalado, de ombligo pequeño. |
| Fecha de selección | 1992. | Apariencia externa del fruto | Color naranja intenso a rojizo. |
| Primer Registro PBR | PT 4929. (Sudáfrica) | Apariencia interna | Pigmentación rojo oscuro (semejante a un pomelo rojo). Muy adecuada para añadir color a zumos y ensaladas. De corteza fina. Con niveles muy altos de antioxidantes. |
| Fecha de maduración | En Sudáfrica inicio de maduración finales de junio. (Equivalente en el Hemisferio Norte a finales de diciembre). La recolección es de 6 a 8 semanas. Un poco más tardía que la Washington Navel y la Navel Cara Cara. | Facilidad de pelado | Fácil. |
| Observaciones de cultivo | Muy productiva. De rápida entrada en producción. Patrón de crecimiento similar al de un Washington Navel. En zonas cálidas la pigmentación roja del fruto se ve acentuada. | Semillas | Ninguna. |
| Portainjerto usado en la evaluación | Limonero Rugoso. La variedad es compatible con citrange Troyer, citrange Carrizo y con citrumelo Swingle. | Sabor | Excepcional sabor debido a su alta calidad interna. |

Disclaimer:

Las características, evolución y resultado de la variedad vegetal aquí descrita, lo son con referencia a los análisis, estudios y comprobaciones realizados, durante años, en otros países. La implantación de la variedad descrita en otros territorios, podría conllevar diferencias; el titular de la variedad no es responsable de las variaciones que pudiera experimentar ésta como consecuencia de su implantación fuera de origen.

Copyright © 2012



AFRICA · EUROPE · CHINA · INDIA · USA · SOUTH AMERICA · AUSTRALIA

Biogold Network EM, S.A. (Europe Mediterranean) T. +34 954 460 498 - info@biogold-em.com - www.biogold-em.com - Skype:biogold-em