


NAVELATE


<http://www.ivia.gva.es/variedades/>

Mutación de Washington originada en Vinaroz (Castellón). Árbol vigoroso, con presencia de pequeñas espinas incluso en las ramas de fructificación. Las flores carecen de polen y los frutos presentan ombligo, aunque de menor tamaño que otras variedades del grupo navel.

Los frutos poseen una gran calidad organoléptica y buena consistencia, aunque de calibre mediano y forma ligeramente alargada. En madurez, la corteza es bastante sensible al viento frío y se producen lesiones tipo “pateta de rata”, más acusadas si el patrón es Citrange. El fruto tiene poca adherencia al pedúnculo cuando madura, precisando de varios tratamientos si se desea mantener la fruta en el árbol hasta finales de marzo.



EVOLUCION DE LA MADUREZ DEL FRUTO



Características fruto	
Peso g	160 - 200
Diámetro mm	65 - 70
Forma	Redonda alargada Diámetro / Altura = 0,97
Corteza mm	3 - 3,5 Corteza más lisa que Washington
Color	Naranja índice color = 11
% zumo	50 - 54
Semillas	No
Fructificación	Media, aunque requiere adecuados niveles de microelementos en el abonado y tratamiento para el cuajado.
Recolección	15 enero - 31 marzo